



Surkling i øvre luftveier

- Gi Robinul 0,2 mg subkutan (sc) når surkling oppstår
- Fortsett med Robinul 0,2 mg sc inntil x 1/time etter behov, maks 1,2 mg i døgnet (det tilsvarer 6 doser/24 t). Bruk eventuelt kontinuerlig subkutan infusjon (KSCI) med Robinul 0,6 -1,2 mg/24 t

For pasienter som i tillegg til surklingen puster anstrengt eller hurtig, og som ikke bruker et opioid fra før av, kan det være aktuelt å forskrive en kombinasjon av morfin 2,5-5 mg sc og Robinul sc som angitt over.

Pasienten selv er vanligvis ikke plaget av sin surkling. Vurder sideleie.
Er væskebehandling seponert?
Bruk av sug frarådes.
Gi informasjon/forklaring til de pårørende.

Hvis symptomkontroll ikke oppnås, kontakt ditt lokale eller regionale palliative team.

Glykopyrroniumbromid, Robinul®..... antikolinergikum (muskarineffekt) (surkling i luftveier ikke godkjent indik.område)

Effekt: tørker ut slimhinnene

Relevante bivirkninger i livets slutfase: tørr og varm hud, ev. temperaturstigning, urinretensjon. Se Felleskatalogen.

Virkning inntre: sc: etter 30-40 min, iv: etter 1 min

Tid til maks plasmakonsentrasjon:..... iv: umiddelbart, po og sc: data mangler

Plasma halveringstid: 1-1,5 t

Virkningstid: 7 t

Palliative Care Formulary 8th ed.