

LABORATORIEKLINIKKEN

Foretak/Rekv.kode:

Enhet/Legekantor:

Lege (for- og etternavn):

Mobilnummer:

Klinisk problemstilling:

CORTAD-studien

Fødselsnr.

Navn

Adresse

Poststed

Betales av: Poliklinikk/Helfo Innlagt i sykehus Bedrift

Prøven tatt

Prøvetaker:

Kvinne Mann

Etiketten plasseres kant i kant med originaletiketten på prøverøret



Prøver som skal sendes til ROAS

Sett kryss ved rett besøk

- Visitt 2 (ved baseline):**
 - 10 ml avpipetert serum og 2 x 6ml EDTA blod

- Visitt 5 (6 mnd. etter inklusjon):**
 - 5 ml avpipetert serum og 6ml EDTA blod
 - 3 spyttprøver

- Visitt 6 (12 mnd. etter inklusjon):**
 - Medikamentfastende blodprøve: 5 ml avpipetert serum og 6ml EDTA blod
 - To timer etter Cortison/Plenadren inntak: 5 ml avpipetert serum og 6ml EDTA blod
 - 3 spyttprøver
 - 5 ml døgurnurin:
Samlevolum (diurese): _____ ml prøvetakingsperiode: _____ - _____

Husk å merke glass og rekvisisjon med navn og personnummer.

Spyttprøvene tas før tablettinntak, 1 time etter tablett og 4 timer etter inntak.

Spyttprøvene **MÅ** merkes med klokkeslett!

NB! Viktig at serumprøvene sentrifugeres og avpipetteres før forsendelse

Medikamentfastende = ikke tatt dagens dose cortison/plenadren

Send prøvene til
Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi
Husebye v/ Endo spes.lab HUS
Haukeland universitetssjukehus
5021 Bergen