

STRÅLESKADET TARM

HENVISNING TIL HYPERBAR OKSYGENBEHANDLING.

Kjære henviser!

Ved Seksjon for hyperbarmedisin har vi nasjonal behandlingstjeneste for elektiv hyperbar oksygenbehandling (HBO). For alle praktiske formål må derfor utredning skje på hjemstedet og vi er avhengige av en fyldig henvisning med relevante opplysninger for å ha mulighet til å behandle den i løpet av ti virkedager.

Pasienter med klinisk relevante symptomer på grunn av stråleskader i tarm kan henvises til HBO. Stråleskaden skal være verifisert med nedre endoskopi og helst biopsi. Pasienten får ca 30 behandlinger (poliklinisk seriebehandling i seks uker). Formålet er stimulering av neoangiogenese og sekundær vevsregenerasjon. Effekt av behandlingen kan ikke ventes før åtte uker etter avsluttet behandling, da neoangiogenese tar tid.

I henvisningen trenger vi følgende informasjon:

- Henvisningsdiagnose
- Aktuell sykehistorie med opplysning om relevant utredning og behandling.
- Kopi av beskrivelsen ved nedre endoskopi.
- Tidligere sykehistorie. Bekreftelse på fravær av kontraindikasjoner (se oversikt over kontraindikasjoner på www.helse-bergen.no/trykkammer).
- Fast medikasjon
- Kopi av beskrivelse av rtg thorax (ikke CT) ikke eldre enn 12 mndr. (Emfysematøse bullae/pneumothorax/underventilerte lungeavsnitt kan medføre lungesprengning når vi dekomprimerer trykkammeret).
- Ved lungesykdom / storrøykere / hyperinflaterte lunger på thoraxbildet trenger vi kopi av spirometribeskrivelse ikke eldre enn 6 mndr.
- Ved alvorlig hjertesvikt trenger vi kopi av beskrivelse av ekko cor ikke eldre enn 6 mndr.
- Seksjon for hyperbarmedisin er en poliklinikk uten tilknyttet sengepost. Dersom pasienten ikke er i stand til å klare seg selv, må henvisende instans søke pasienten innlagt i egnet klinisk avdeling og kopi av henvisningen legges ved henvisningen til Seksjon for hyperbarmedisin.

Det er ønskelig (men ikke nødvendig for vurderingen) at henvisningen inneholder opplysning om hvorvidt pasienten har klaustrofobi, om pasienten har spesielle problemer med trykkutligning til ørene og om pasienten trenger ledsager under reise og/eller opphold.

Henvisning sendes:

Seksjon for hyperbarmedisin
Yrkesmedisinsk avd
Haukeland Universitetssykehus
5021 Bergen

