



Endoskopisk Ultralyd (EUS)

– Endoskopi møter ultralyd

UL kurs for spesialistkandidater i
fordøyelsessykdommer 2022

ROALD FLESLAND HAVRE


OVERLEGE/PROFESSOR K1, MED AVD SEKSJON FOR
FORDØYELSESSYKDOMMER OG NASJONALT SENTER FOR
GASTROINTESTINAL ULTRALYD, HUS

Agenda




- ▶ Endoskopisk ultralyd (EUS) – prinsipp og bruksområde
- ▶ EUS indikasjoner
- ▶ EUS stadievurdering av kreft i øsofagus
- ▶ EUS ved Kronisk pankreatitt
- ▶ EUS veiledet vefsprøvetaking
- ▶ Kontrastforsterket EUS: perfusjon
- ▶ EUS veiledet terapi
 - ▶ EUS veiledet dreansje
 - ▶ Strålemarkører
 - ▶ EUS veiledet ablasjon (RFA)



Endoskopisk UL (EUS)



©2006MGS Studio



©2006MGS Studio





Lineær EUS



Indikasjoner

- ▶ **EUS avbildning med eller uten vevsprøvetaking:**
 - ▶ Utredning av subepiteliale forandringer
 - ▶ Lymfeknuter i mediastinum/retroperitoneum
 - ▶ Galleveier (funn av dilatasjon)
 - ▶ Tumor / cyster i pankreas / kronisk pankreatitt
 - ▶ (Staging av cancer i øsofagus og ventrikkel)
- ▶ **Endoskopisk behandling**
 - ▶ pseudocyster
 - ▶ dilaterte galleveier
 - ▶ blødende øsofagusvaricer
 - ▶ gastroenterostomi mm.


Hvordan UL avbilder vegglag i GI traktus med høy frekvens (7.5-20 MHz)



Histologi


Ultralyd

TNM stadievurdering – eksempel øsofagus



Thomas W. Rice. Staging of esophageal cancer: TNM and beyond. Esophagus (2010) 7:189–195

Kasus 1: Stenotisk tumor i øsofagus



Kasus 2: Kvinne 67 år Øsofagustumor,
stenose

22/02/2012

14:24:14

12MHz 6cm

G:10/19 I:S

C:5/8 FC:3

L.DEN:x4.0

TX:100%

MEDIA

T/B:NONE

7/160


+: 10.7mm

x: mm

◊: mm

△: mm

CNCT:L R



Revidert Nasjonalt handlingsprogram for øsofaguscancer - 2020



Helsedirektoratet

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av spiserørskreft

NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE
IS-2878

- Nytt i denne retningslinjen:
- EUS anbefales for stadieinndeling når dette kan få terapeutiske konsekvenser.
 - Pasienter med dysplasi og intramukosalt karsinom bør få tilbud om endoskopisk behandling. (T1a, N0, M0)
 - **Endoskopisk behandling bør sentraliseres til få sykehus**

Helsedirektoratet.no

Utgitt 02/2020, 5. utgave **Bestillingsnummer** IS-2878 **ISBN** 978-82-8081-612-2

Praktisk tilnærming

- ▶ Stadievurdering er primært basert på CT funn
- ▶ Ved gastroskopi:
 - ▶ Ikke passabel tumor: T3-T4 (EUS unødvendig)
 - ▶ Passabel tumor: T1-T2 (EUS kan gi nyttig info)
 - ▶ Endoskopisk reseserbar: T1a, (SM1).
- ▶ EUS ved tvil om T-stadium og for lymfeknutediagnostikk med FNA
hvis det har terapeutiske konsekvenser

HITACHI

EUS-Longitudinal

P:100% MI 0.8

TIS<0.4

EUS linear
probe

Kronisk pankreatitt



Calip
+ D1

3.6 mm

FR:35

EG-3870UTK

BG:19 DR:85

dTHI-W-R

Chronic pancreatitis with
stranding, dilated pancreatic
duct (PD), and a calcified
area close to the wall of the
PD + several other
calcifications.

HITACHI


EUS linear
probe

EUS-Longitudinal

P:100%

MI 0.8

TIS<0.4



Calip

+ D1

2.8 mm


FR:35

EG-3870UTK

BG:19 DR:85
dTBI-W-R


HITACHI

EUS linear
probe



EUS-Longitudinal

P:100% MI 0.8 TIS<0.4



FR:14
EG-3870UTK

BG:19 DR:85 F.Rej:4 N.Rej:3
dTHI-W-R Low BL.:26%

FR:14
EG-3870UTK

BG:19 DR:85
dTHI-W-R

Rosemont score: a weighted score for Chronic pancreatitis by endoscopic US

Parenchymal findings

1. Hyperechoic foci with shadowing (Major A)
2. Lobulation
 - a) with “honeycombing” (Major B)
 - b) Lobulation without honeycombing (minor)
3. Hyperechoic foci without shadow (minor)
4. Cysts (minor)
5. Stranding (minor)

Pancreatic duct

1. Calcifications in the PD with shadow (Major A)
2. Irregular MPD contour (minor)
3. Dilated side branches > 1 mm (>3) (minor)
4. Dilated PD >3.5mm in body, >1.5 mm in tail (minor)
5. Hyperechoic MPD contour >50% of body/tail (minor)

Catalano et al. Gastrointest Endosc. 2009 Jun;69(7):1251-61. Epub 2009 Feb 24.EUS-based criteria for the diagnosis of chronic pancreatitis: the Rosemont classification.

Endoskopisk Ultralydveiledet Finnålsasbiopsi

- ▶ EUS kan brukes til å veilede vevsprøvetaking
- ▶ Nålen føres gjennom arbeidskanalen og inn i lesjonen
- ▶ Cytologi eller biopsinåler 22-19G
- ▶ Svulster/lymfeknuter/ cyster
- ▶ Disse prosedyrene er utføres som ledd i «pakkeforløp» flere ganger i uken



Praksis for EUS veiledet finnålaspirasjon (FNA)

Pasientforberedelse

Egner lesjonen seg for punksjon?

Valg av nål

Antall innstikk


Kontroll av materiale

(representativt?)

Fixering / farging /biokjemi /
dyrking


Pasient observasjon

For alle indikasjoner: Resultatet av en
vevsdiagnose må påvirke behandlingsvalg



Finnålsaspirasjon (FNA) eller nålebiopsi (FNB)?


- ▶ Hva stikker vi på?
 - ▶ Lymfeknuter (mediastinum og retroperitonealt)
 - ▶ Subepiteliale tumores
 - ▶ Pancreastumores
 - ▶ Pancreascyster
 - ▶ Venstre binyre
 - ▶ Andre retroperitoneale tumores
- ▶ Kort vei
- ▶ Fargedoppler for å unngå kar i stikkretning
- ▶ Elastografi eller kontrastforsterket US



EUS + Contrast =




- ▶ Ultralyd kontrastmidler: En inert gass i et skall av fosfolipider.
- ▶ Ved påvirkning av UL begynner boblene å sende ut et non-lineært UL signal (ringelyd).
- ▶ Viktig å redusere UL effekt (MI), slik at boblene ikke sprekker av UL signalet
- ▶ Det non-lineære signalet kan skilles fra «vevssignalet» og vi får fremstilt kontrastens vei gjennom kapillærerne og fremstiller perfusjon.
- ▶ En bolus injeksjon kan følges tidsmessig: arterielt (0-30 s) og venøs fase (30 s +)




Case 1: Solid tumour in pancreatic head

- ▶ EUS Sonazoid
- ▶ Female, 58 years.
- ▶ CT: Tumour in pancreatic head.





Colour Doppler




FR:13
EG-3870UTK

BG:19 DR:13
dTHI EG-3870UTK


BG:19 DR:85 CG:40 CF:M
dTHI-WV-R 800/5.0MHz



EUS- elastography (RTE)



Contrast enhanced elastography: Sonazoid





Case 1: Summary

- ▶ Diameter 2-3 cm, hypoechoic, harder on elasto
- ▶ Sonazoid: Early uptake of contrast to nearly isoechoic at 16 s. Thereafter wash out. At 36 s clearly hypoenhancing compared to surrounding pancreatic parenchyma.
- ▶ EUS FNA 25 G: On site evaluation: cellular variability, suspect for malignant cells, Cytology: Malignant cells, ductal adenocarcinoma.
- ▶ Whipple surgery 28.07.15: Removal of 3 cm tumour in pancreatic head/proc. uncinatus. Radical surgery, Lymph nodes 0/10. Staging: pT3, N0.
- ▶ CE-EUS: Typical findings for **adenocarcinoma**




Sammendrag EUS med elastografi og CE-EUS

- ▶ Elastografi (strain) viser ulikheter i vevshardhet. Fokale lesjoner som fremstår med økt vevshardhet er mer suspekte for malignitet enn lesjoner med lav vevshardhet.
- ▶ Ultralyd kontrastmidler er gassbobler med størrelse nær blodceller, som er laget av fosfolipider og en inert gass.
- ▶ De forsterker signal fra blodstrøm og fremstiller *perfusjon*.
- ▶ Maligne svulster har:
 - ▶ tidlig arterielt opptak
 - ▶ ofte noe lavere opptak av kontrast
 - ▶ *vasker ut kontrasten* tidligere enn normal vev.



EUS veiledet terapi

- ▶ EUS veiledet coiling/liming av varicer
- ▶ EUS veiledet drenasje av pseudocyster
- ▶ Direkte endoskopisk nekrosektomi av «walled-off-necrosis»
- ▶ Gastroenterostomi
- ▶ Gallegangsdrenasjer
- ▶ EUS veiledet drenasje av pancreasgang
- ▶ EUS veiledet innlegging av strålemarkører
- ▶ EUS veiledet ablasjon i pancreas






EUS veiledet drenasje av pseudocyster med dobbel pigtail stent



Lumen apposing metal stents (LAMS)

- ▶ Diatermi integrert i avleveringsmekanismen
- ▶ Selvekspanderende
- ▶ To krager som holder hulorganer sammen
- ▶ Etter hvert dannes det en tett fistel
- ▶ Kan kombinere med dobbel pigtail stent


Hot Spaxus (Tewoong Medical)



Hot Axios. Foto: Boston Scientific



Cyste /abscess drenasje

- ▶ pseudocyster i pankreas etter akutt pankreatitt/
- ▶ væskeansamling postoperativt
- ▶ «disrupted duct syndrome»
- ▶ Cyste > 4-6 cm symptomgivende, eller infisert
- ▶ <1 cm avstand til cystevegg
- ▶ Prosedyre: Innstikk med diatermi og anleggelse av «Lumen Apposing Metal Stent» (LAMS)



EUS som ledd i behandlingen: EUS veiledet plassering av strålemarkører


- ▶ Strålemarkører (fiducials) benyttes for å markere randsone for svulster slik av strålefelt kan planlegges mer nøyaktig
- ▶ Stråle hele tumor – unngå friskt vev mest mulig
- ▶ Flere typer tilgjengelig:



Plassering av strålemarkører EUS veiledet og endoskopiveiledet




EUS: Fiducial i øsofagusvegg
Bilder: Pham KCD




Lugol farger normalt plateepitel brunt, tumor
vokser lengre enn antatt på CT og EUS i mucosa


EUS veiledet radiofrekvensablasjon (RFA)

- ▶ Mulighet for temperaturkontrollert RFA gjennom EUS skop
- ▶ Utstyr: EUSRA,væskekjølt RFA probe (Starmed/Taewoong)



Case 2: Insulinom i pancreas med farge-Doppler









FR:16
EG-3870UTK

BG:21 DR:85 CG:18 CF:M
dTHI-W-R 800/5.0MHz

EUS FNA



Videre forløp

- ▶ Pasienten ble behandlet med EUS veiledet RFA
 - ▶ To ablasjonsrunder til vi så «bobler» i lesjonen
- ▶ Pasienten var euglykemisk fra neste dag
- ▶ Pasienten sluttet å måle blodsukker etter ca 3 uker med normalt blodsukker
- ▶ Kontroll 3 mnd: Ikke mulig å påvise lesjonen igjen med EUS/Doppler/kontrast.



Oppsummering

- ▶ EUS benyttes til stadievurdering av cancer hvis det får terapeutisk konsekvens
- ▶ EUS med Doppler, Elastografi og kontrastforsterket EUS gir mulighet for vevskarateristikk
- ▶ EUS veiledet terapi er tilgjengelig som
 - ▶ Drenasje av pseudocyster og WON/andre væskeansamlinger
 - ▶ Etablering av endoskopisk gastroenterostomi ved «gastric outlet obstruction»
 - ▶ For gallegangsdrenasje internt (heptogastrostomi)
 - ▶ EUS veilede strålemarkører for bedre strålebehandling
 - ▶ For RFA behandling av pancreatiske nevroendokrine tumores, bl.a. insulinomer