



## Kvalme

Gi Haldol® 0,5-2 mg x 2\*  
sc i fast dosering eller  
inntil x 2 ved behov

**\*Til gamle og skrøpelige pasienter:**

Haldol® 0,5 mg x 2 sc

Hvis symptomkontroll ikke oppnås, vurder:

Syklizin (Valoid®) 50 mg x 3 sc (25 mg x 3 sc til gamle).

Syklizin injeksjonsvæske 50 mg/ml (Valoid®, Cyclizine) er ikke registrert, men kan fås fra Sjukehusapoteka i Bergen og i Haugesund.

Alternativt kontakt ditt lokale eller regionale palliative team, eller Sunniva avdeling for lindrende behandling i Bergen: 55 97 94 00 – hele døgnet.

**Haloperidol, Haldol®:**..... lavdoseneuroleptikum  
**Effekt:**..... antiemetisk, antipsykotisk  
**Relevante bivirkninger i livets slutfase:**..... ekstrapyramidale. Se Felleskatalogen.  
**Virkning etter:**..... sc: 10-15 min, po: > 1 t  
**Tid til maks plasmakonsentrasjon:**..... po: 2-6 t, im: 20-30 min  
**Plasma halveringstid:**..... 12-38 t  
**Virkningstid:**..... opp til 24 t, noen ganger lenger

Palliative Care Formulary 6th ed.