Surkling i øvre luftveier

Ja

Glykopyrron (Robinul®, Glycopyrrolat*):

1mnd-12år:
4-8 mikrogram/kg iv/sc hver 6.time
(maks 200 mikrogram/dose)

12-18 år:
4-5 mikrogram/kg iv/sc hver 6. time
(maks 400 mikrogram/dose)

*Kan fås fra Sjukehusapoteket i Bergen

Hvis pasienten trenger mer enn
3 doser per 24 timer: Vurder kontinuerlig subkutan infusjon

For pasienter som ikke bruker opioid:
Vurder **Morfin** 0,05 mg/kg **sc/iv** i tillegg til glykopyrron
Se algoritme for smertebehandling

Nei

Surkling kan oppstå

Behovsmedikasjon:

Glykopyrron
1mnd-12år:
4-8 mikrogram/kg iv/sc hver 6. time
(maks 200 mikrogram/dose)

12-18 år:
4-5 mikrogram/kg iv/sc hver 6. time
(maks 400 mikrogram/dose)

Morfin
Se algoritme for smertebehandling

SURKLING:
Pasienten er vanligvis ikke plaget av sin surkling, gi forklaring om dette til de pårørende.
Vurder sideleie

Er væskebehandling seponert?
Suging frarådes, kan gi økt slimproduksjon pga. irritasion av slimhinner