



Surkling i øvre luftveier

- Gi Robinul 0,2 mg subkutant (sc) når surkling oppstår
- Fortsett med Robinul 0,2 mg sc inntil x 1/time etter behov, maks 1,2 mg i døgnet (det tilsvarer 6 doser/24 t). Bruk eventuelt kontinuerlig subkutan infusjon (KSCI) med Robinul 0,6 -1,2 mg/24 t

For pasienter som i tillegg til surklingen puster anstrengt eller hurtig, og som ikke bruker et opioid fra før av, kan det være aktuelt å forskrive en kombinasjon av morfin 2,5-5 mg sc og Robinul sc som angitt over.

Pasienten selv er vanligvis ikke plaget av sin surkling. Vurder sideleie.
Er væskebehandling seponert?
Bruk av sug frarådes.
Gi informasjon/forklaring til de pårørende.

Hvis symptomkontroll ikke oppnås, kontakt ditt lokale eller regionale palliative team.

Glykopyrroniumbromid, Robinul®	antikolinergikum (muskarineffekt) (surkling i luftveier ikke godkjent indik.område)
Effekt:	tørker ut slimhinnene
Relevante bivirkninger i livets slutfase:	tørr og varm hud, ev. temperaturstigning, urinretensjon. Se Felleskatalogen.
Virkning inntre:	sc: etter 30-40 min, iv: etter 1 min
Tid til maks plasmakonsentrasjon:	iv: umiddelbart, po og sc: data mangler
Plasma halveringstid:	1-1,5 t
Virkningstid:	7 t

Palliative Care Formulary 7th ed.