



## Surkling i øvre luftveier

Robinul ordineres initialt som behovsmedikasjon inntil x 6 /d  
Gi 0,2 mg sc inntil 1 x / time etter behov og inntil 1,2 mg  
tilsvarende 6 doser / 24 timer. Bruk evt. KSCI (sc-sprøytepumpe).

For pasienter som, i tillegg til surklingen, puster anstrengt eller hurtig, og som ikke bruker et opioid fra før av, kan det være aktuelt å forskrive en kombinasjon av morfin 2,5-5 mg sc og Robinul sc som angitt over.

Pasienten selv er vanligvis ikke plaget av sin surkling. Vurder sideleie.  
Gi informasjon/forklaring til de pårørende.  
Er væskebehandling seponert?  
Bruk av sug frarådes.

Hvis symptomkontroll ikke oppnås, kontakt ditt lokale eller regionale palliative team, eller Sunniva avdeling for lindrende behandling i Bergen hele døgnet på 55 97 94 00.

**Robinul®**..... antikolinergikum (muskarineffekt) (surkling i luftveier ikke godkjent indik.område)  
**Effekt:** ..... tørker ut slimhinnene  
**Relevante bivirkninger i livets slutfase:** ..... tørr og varm hud, ev. temperaturstigning, urinretensjon. Se Felleskatalogen.  
**Virkning inntre:** ..... sc: etter 30-40 min, iv: etter 1 min  
**Tid til maks plasmakonsentrasjon:**..... iv: umiddelbart, po og sc: data mangler  
**Plasma halveringstid:** ..... 1-1,5 timer  
**Virkningstid:** ..... 7 timer

Palliative Care Formulary 6th ed.