

MRSA

- Meticillinresistente Staphylococcus aureus




Kriterier for MRSA-prøve ved innleggelse eller pasientrettet arbeid i sykehus

Mer enn 12 mnd. siden

Alle som har:

Fått påvist MRSA, men senere ikke hatt 3 negative kontrolltester



Siste 12 måneder

Alle som har:

- fått påvist MRSA, (selv om de senere kontrollprøvene har vært negative) eller
- bodd i samme husstand som MRSA-positive, eller
- hatt nær kontakt¹⁾ med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr

Alle som har vært utenfor Norden og der har:

- vært innlagt i helseinstitusjon, eller
- fått omfattende undersøkelse eller behandling²⁾ i helsetjeneste, eller
- arbeidet som helsearbeider³⁾ eller
- oppholdt seg i barnehjem eller flyktningleir

Alle som har kliniske symptomer på sår-/hudinfeksjon, kronisk hudlidelse eller medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinne og som har:

- oppholdt seg sammenhengende i mer enn 6 uker i land utenfor Norden

MRSA-prøve ved innleggelse eller pasientrettet arbeid i sykehus

Fremgangsmåte ved prøvetaking for MRSA

Bruk vanlig prøvetakingsutstyr (Amies pensel) inklusiv transportmedium. Ta ett prøvetakingssett, det vil si en prøve fra hvert prøvetakingssted.

Prøvetaking av pasienter

Prøver tas fra følgende steder:

- ytterst i hvert nesebor, 1 cm inne i nesen (samme pensel)
- begge tonsillelosjer, bildets røde skraveringer, og svelgvegg, bildets grønne skraveringer, (samme pensel)
- perineum
- sår, eksem, ferske arr eller andre defekter i huden
- innstikksteder for fremmedlegemer
- v/ permanent urinveiskateter tas det urinprøve

Prøvetaking av personale

Ved forhåndsundersøkelse og smitteoppsporing tas prøver på følgende steder:

- ytterst i hvert nesebor, 1 cm inne i nesen (samme pensel)
- begge tonsillelosjer, bildets røde skraveringer, og svelgvegg, bildets grønne skraveringer, (samme pensel)
- sår, eksem, ferske arr eller andre defekter i huden

Ved kontroll etter sanering tas prøvene som ved prøvetaking av pasienter.

Forklaring til kriteriene

1 Med nær kontakt menes kontakt som gir begrunnet mistanke om smitte, eksempelvis:

- hatt hudkontakt med kjent MRSA-positiv og en eller begge hadde sår
- flere ganger hatt hudkontakt med kjent MRSA-positiv (selv om begge har hel hud)
- arbeidet med en kjent MRSA-positiv pasient som ikke isoleres (for eksempel i sykehjem eller i hjemmesykepleien)
- arbeidet i eller vært pasient i en helsetjeneste der det pågikk et MRSA-utbrudd

2 Med omfattende undersøkelse eller behandling menes:

- at undersøkelsen/behandlingen har vært langvarig (flere timer)
- at fremmedlegemer har blitt ført gjennom hud eller slimhinner, eller lagt inn gjennom kroppsåpninger, eksempelvis kirurgisk inngrep (også i tannhelsetjenesten), dialyse, innleggelse av venekateter, urinkateter, dren, tube og lignende
- sårbehandling, eksempelvis suturering eller stell av større sår

3 Med arbeidet som helsearbeider menes alt pasientrettet arbeid i og utenfor helseinstitusjoner, for eksempel som primærlege, i hjemmetjenesten, i sykehjem eller sykehus, i bistands- eller nødhjelpsarbeid.

Flere miljøer enn de nevnte, i pkt. 1 og 3, kan ha økt forekomst av MRSA. MRSA-prøve tas dersom det fremkommer opplysninger om at pasienten har oppholdt seg i et miljø der det er økt risiko for å bli smittet med MRSA.

Det henvises forøvrig til lokale smittevern-/hygienehåndbøker.