

Klassifikasjoner av kontrastmiddelreaksjoner.

Gjelder både for intravenøs og intraarteriell jodkontrast injeksjon (ikke-ionisk kontrastmiddel) og i.v MR- kontrast (gadolinium)

Definisjon akutt kontrastmiddelreaksjon

En reaksjon som oppstår innen 1 time etter injeksjon av kontrastmiddel.

Reaksjonene begynner vanligvis innen 5 minutter, og nesten alle innen 15 minutter

Klassifikasjon	
Milde reaksjoner	<ul style="list-style-type: none">• Kvalme, milde brekninger• Urticaria• Kløe Reaksjoner som ofte ikke trenger medisinsk behandling og er ikke til stort hinder for undersøkelsen.
Moderate reaksjoner	<ul style="list-style-type: none">• Kraftig eller langvarig oppkast• Tydelig urticaria• Moderat bronkospasme• Ødem i ansikt og/eller hals• Vasovagalt anfall Symptomatisk behandling er nødvendig og / eller undersøkelsen blir forsinket eller avbrutt. Pasienten bør etter slike episoder observeres et par timer
Alvorlige reaksjoner	<ul style="list-style-type: none">• Alvorlig hypotensjon - sjokk• Hjertestans• Livstruende luftveisødem/bronkospasme• Kramper

Referanse: [ESUR Guidelines](#) on Contrast media, versjon 9.0