

## SAPS II-SKÅRING I NIR (FOR PASIENTER > 16 ÅR VED INNLEGGELSE INTENSIV)

Etter planlagt operasjon: til intensiv etter elektiv operasjon i løpet av de siste 7 døgn (0 poeng)

Akutt non-operativ: til intensiv uten forutgående operasjon de siste 7 døgn (6 poeng)

Etter akutt operasjon: til intensiv etter akutt operasjon i løpet av de siste 7 døgn (8 poeng)

**Ikke operasjon:** Invasiv radiologi (punksjoner, drensinnleggelse o.l.) og invasiv kardiologi (f.eks. PCI).

**Ikke operasjon:** Diagnostiske prosedyrer (skopier etc.), selv om pasienten skulle trenge intubasjon/anestesi.

**Operasjon (akutt eller planlagt):** Inkluderer invasive prosedyrer med terapeutiske tiltak (sklerosering av øsofagusvaricer og blødende ventrikelulcera, stenting av aortaaneurisme, TAVI, innlegging av pacemaker etc.).

**NB!** Skår ut fra verdier som gjenspeiler pasienten sin tilstand, ikke kortvarige, tilfeldige avvik som er knyttet til målefeil, bolusdoser, stell/snuing, smertefulle prosedyrer osv. Dette gjelder typisk puls og blodtrykk.

SAPS II skal fylles ut med utgangspunkt i de verdier man har første 24 t av intensivoppholdet.

- Ved død <24 timer: bruk verdier knyttet til innleggelsestidspunktet/den første fasen av intensivoppholdet, ikke «preterminale» verdier.
- Ved utskrivning fra intensiv <24 timer: bruk verdier for hele intensivoppholdet.
- Ved manglende verdier i SAPS II-skåren: fyll inn slik at skåren blir 0 for de aktuelle feltene.
- På sederte pasienter skal GCS skåres ut fra tilstand før intervensjon/sedasjon etc.
- Ved manglende opplysninger og sedert pasient, settes GCS til 15.
- Ved hjertestans der GCS er 3 ved resuscitering, og der pasienten blir sedert/kjølt videre, kan man skåre GCS til 3.

SAPS II (poeng i parentes)						
Kroniske sykdommer	AIDS (17)	hematologisk malignitet (10)	metastatisk cancer (9)	ingen (0)		
Glasgow Coma Scale (GCS)	14-15 (0)	11-13 (5)	9-10 (7)	6-8 (13)	<6 (26)	
Alder (automatisk)	<40 (0)	40-59 (7)	60-69 (12)	70-74 (15)	75-79 (16)	80+ (18)
Systolisk blodtrykk mm Hg	100-199 (0)	≥ 200 (2)	70-99 (5)	<70 (13)	≥ 200 (2)	
Pulsfrekvens	70-119 (0)	40-69 (2)	120-159 (4)	> 160 (7)		
Temperatur (°C)	<39 (0)	≥ 39 (3)				
PaO <sub>2</sub> /FIO <sub>2</sub> -ratio (kPa)	≥ 26,6 (6)	13,3-26,5 (9)	<13,3 (11)	<b>NB! kun ved respiratorstøtte</b>		
Urinproduksjon/24 t (mL)	≥ 1000 (0)	500-999 (4)	<500 (11)	Ved opphold under 24 t, regn om til verdi/24 t		
S-karbamid (mmol/L)	<10 (0)	10-29,9 (6)	> 30 (10)			ikke obligatorisk
Leukocytter (x10 <sup>9</sup> /L)	1-19,9 (0)	> 20 (3)	< 1 (12)			
S-natrium (mmol/L)	125-144 (0)	≥ 145 (1)	<125 (5)			
S-kalium (mmol/L)	3-4,9 (0)	<3 (3)	≥ 5 (3)			
S-HCO <sub>3</sub> (mmol/L)	≥ 20 (0)	15-19 (3)				ikke obligatorisk
S-bilirubin (µmol/L)	<68,4 (0)	68,4-102,5 (4)	> 102,5 (9)			ikke obligatorisk